



TIPSKUPON_HJERTET	1	X	2
<p>1. Hjertet er en ...</p> <p>1 muskel</p> <p>X kirtel</p> <p>2 kirtel-muskel</p>			
<p>2. Blodkarrene, som forsyner hjertemusklen med ilt og næring, hedder ...</p> <p>1 kranspulsårene/koronarkarrene ...</p> <p>X aorta</p> <p>2 kapillærer</p>			
<p>3. Hjertets pumpefunktion måles i %, og når hjertet pumper normalt, så er pumpefunktionen ...</p> <p>1 100 %</p> <p>X 60 %</p> <p>2 95 %</p>			
<p>4. De elektriske impulser, som styrer hjertets sammentrækning, starter...</p> <p>1 i hypofysen</p> <p>X i rygmarven</p> <p>2 i sinusknuden</p>			
<p>5. Hvis man har åreforsnævringssygdom i hjertet/iskæmisk hjertesygdom, så ...</p> <p>1 er hjertets hulrum/kamre forkalkede</p> <p>X er kranspulsårene forsnævrede</p> <p>2 er kroppens veneklapper defekte</p>			
<p>6. Hjertekrampe/angina pectoris er ...</p> <p>1 udtryk for, at brystmusklerne er belastede af f.eks. svær åndenød</p> <p>X hjertets signal om, at hjertemusklen mangler ilt</p> <p>2 lungernes signal om, at de er meget belastede</p>			
<p>7. Hjertekrampe opleves ...</p> <p>1 altid ens hos alle</p> <p>X forskelligt, men ikke ualmindeligt som smerter i brystet og/eller armen(e), evt. med åndenød</p> <p>2 altid forskelligt hos kvinder og mænd</p>			

TIPSKUPON_HJERTET	1	X	2
<p>8. Medicin som man kan tage efter behov mod hjertekramper, når det er aftalt med en læge er ...</p> <p>1 nitroglycerin</p> <p>X hjertemagnyl eller magnyl</p> <p>2 betablokkere, f.eks. metoprolol</p>			
<p>9. En blodprop i hjertet opstår ved, at ...</p> <p>1 en blodprop et andet sted i kroppen løsriver sig og sætter sig fast i en kranspulsåre</p> <p>X der går hul på en forsnævring indvendig i en kranspulsåre, og blodplader forsøger straks at udbedre skaden ved at klumpe sig sammen og danne en prop af blod</p> <p>2 kroppens immunforsvar overreagerer</p>			
<p>10. Behandlingen af åreforsnævringssygdom kan være medicinsk, ballonudvidelse (med eller uden stentning) eller bypass-operation.</p> <p>- En stent er et lille metalgitter, som indsættes i forbindelse med en ballonudvidelse og ...</p> <p>1 stenten vil altid skulle blive siddende</p> <p>X stenten skal sidde mindst et par år, hvorefter den fjernes ved et indgreb</p> <p>2 stenten opløses efter nogle år</p>			
<p>11. Risikofaktorer til åreforsnævringssygdom er ...</p> <p>1 rygning, forhøjet kolesterol, usund mad, for lidt motion, forhøjet blodtryk, sukkersyge, svær overvægt/fedme på maven og stress</p> <p>X alkohol</p> <p>2 manglende indtag af daglig vitaminpille</p>			
<p>12. Kolesterol-sænkende medicin skal tages, ...</p> <p>1 indtil kolesteroltallet er sænket tilfredsstillende</p> <p>X livslangt</p> <p>2 i behandlingskure</p>			
<p>13. Når man har en kronisk sygdom som hjertesygdom, så har ...</p> <p>1 kvinder større risiko for udvikling af angst eller depression</p> <p>X man større risiko for udvikling af angst eller depression</p> <p>2 man ikke større risiko for udvikling af angst eller depression</p>			